بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ، چکوال

Barani

خطہ پوٹھوار میں زیتون کی کاشت

زمین اور اسکی تیاری

☆ زیتون کا پودا تقریباً ہر قسم کی زمین پر کاشت کیا جاسکتا ہے

☆ ہموار زمین کے علاوہ یہ ڈھلانوں اور پتھریلی زمین پر بھی کامیابی سے کاشت ہو رہا ہے

☆ زمین میں پانی کا نکاس بہتر ہو اور تیزابی خاصیت 5.5 سے 8.5 تک ہو

☆ زمین میں موجود جھاڑیاں و دیگر جڑی بوٹیاں نکال دیں۔

پتھریلی زمین پر زیتون کی کاشت

ڈھلوانوں پر زیتون کی کاشت

پودے لگانے کے لئے تیاری

☆ قطار سے قطار اور پودے سے پودے کا درمیانی فاصلہ 18 فٹ رکھا جانا چاہیئے

☆ 3×3×3 فٹ جسامت کے گڑھے کھودے جائیں

☆ گڑھوں سے نکالی گئی مٹی کا بالائی ایک تہائی حصہ علیحدہ رکھیں

☆ نیچے کی کم زرخیز مٹی گڑھے کے اردگرد دور کی شکل میں رکھ دیں جو آبپاشی کے دوران پانی کو باہر نکلنے سے روکے گی

☆ تقریباً دو ہفتے تک کھلا رکھنے کے بعد گڑھوں کی بھرائی کر دیں (ایک حصہ بالائی زرخیز مٹی اور دو حصے بھل فی گڑھا)

☆ زیتون کے پودے موسم بہار یا برسات میں لگائے جاسکتے ہیں

گڑھے کی بھرائی

گڑھے کی گہرائی

تیل کے لیے پھل کی حالت

اچار بنانے کے لیے پھل کی حالت

پھل کی برداشت کا غیر روائتی اور روائتی طریقہ

زیتون کے باغات میں مخلوط کاشتکاری

☆ زیتون کا باغ چار سے پانچ سال کے بعد پھل دینا شروع کرتا ہے

☆ ان چار سے پانچ سالوں میں کاشتکار کو خرچہ کے باوجود آمدن نہیں ہوتی

☆ زیتون کے پودے ابتدائی تین سال تک ایک ایکڑ (8 کنال) میں سے صرف تین کنال جگہ گھیرتے ہیں باقی پانچ کنال خالی جگہ پر دیگر فصلات (سبزیاں، گندم، مونگ پھلی، دالیں اور تیل دار اجناس وغیرہ) کاشت کی جاسکتی ہیں

☆ چار سے پانچ سال کی عمر میں زیتون کے پودے پانچ کنال جگہ گھیرتے ہیں اور باقی تین کنال پر مخلوط کاشتکاری کی جاسکتی ہے

زیتون کے باغات میں مخلوط کاشت کاری

تحریر؛ انعام الحق، محمد اشرف سمراء، ڈاکٹر اظہر حسین، محمد عظیم طارق

بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ، چکوال

مزید معلومات کے لیے

فون نمبرز 0543-662002-4

وب سائٹ؛

www.barichakwal.agripunjab.gov.pk

☆ نئی شاخیں آنے والے موسم میں بارآوری کا ذریعہ بنتی ہیں

☆ بڑے پودوں میں بیمار، خشک اور آپس میں الجھی ہوئی شاخوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے

☆ بالکل عمودی رخ پر جانے والی شاخوں کو کاٹ دینا چاہیے

☆ دوران سال جڑوں کے نزدیک تنے کے نچلے حصے سے غیر ضروری شاخیں (Suckers) نکلتی رہتی ہیں، ان کی کٹائی بھی ضروری ہوتی ہے

☆ شاخ تراشی پھل کی برداشت کے بعد نومبر، دسمبر میں مکمل کر لینی چاہیے

غیر ضروری شاخوں کی کٹائی



شاخ تراشی کے ذریعے پودوں کو ہوادار بنانا

پودوں کا بنیادی تنا یقینی رکھنا

پھل کی برداشت اور استعمال

☆ زیتون کی موٹی اقسام کا پھل مصنوعات (اچار مربہ وغیرہ) بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے

☆ یہ اقسام پھل کی سبز حالت میں برداشت کی جاتی ہیں

☆ ان اقسام کو وسط ستمبر سے شروع اکتوبر تک توڑ لینا چاہیے

☆ پھل توڑنے کے بعد ان اقسام سے جلد از جلد مصنوعات تیار کر لینی چاہیں

☆ زیتون کی باریک یا تیل والی اقسام کا پھل 15 اکتوبر کے بعد توڑنا چاہیے

☆ پھل کو ہاتھ یا مشین سے توڑا جاسکتا ہے

☆ پھل توڑنے کے بعد تیل والی اقسام کو 12 سے 24 گھنٹوں کے اندر تیل نکلوانے والی مشین تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ بہتر معیار کا تیل حاصل کیا جاسکے